

Andrea's Botanik - Datenbank

Abteilung
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung
Pterophytina - Farne

Klasse
Eusporangiatæ (Ophioglossopsida) -

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung
Ophioglossales - Natternzungenartige

Familie latein
Ophioglossaceæ

Familie dt
Natternzungengewächse

Lateinischer Artnamen

Botrychium lunaria

Synonyme

Deutscher Artnamen

Mond-Rautenfarn, Echte Mondraute

Länge bzw. Höhe in m
0,05-0,30

Sammelart mehrere Unterarten einjährig Sommer einjährig überwinternd zweijährig hapaxanth ausdauernd Holzgewächs
 Ja

Blütezeit
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 Ja Ja Ja Ja

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg
Licht Temp Kont Feucht Reakt Sticks Sonst Lebens Blattaus Sozio

Rote Liste RLP 1988
Roteliste Ggrac GgradN Bemerkung

giftig Heilpflanze Küche Naturschutz

Arealdiagnose
austr+m/mo-arct (oz) CIRC POL

Pflanzengesellschaft
O Nard.

Bemerkung
Magerrasen und Wegränder, zerstreut

Andrea's Botanik - Datenbank

Abteilung
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung
Pterophytina - Farne

Klasse
Eusporangiateae (Ophioglossopsida) -

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung
Ophioglossales - Natternzungenartige

Familie latein
Ophioglossaceae

Familie dt
Natternzungengewächse

Lateinischer Artname

Botrychium matricariifolium

Synonyme

Botrychium rutaceum, Botrychium ramosum

Deutscher Artname

Ästige Mondraute, Ästiger Rautenfarn

Länge bzw. Höhe in m
0,10-0,20

Sammelart mehrere Unterarten einjährig Sommer einjährig überwinternd zweijährig hapaxanth ausdauernd Holzgewächs

Blütezeit
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg
Licht Temp Kont Feucht Reakt Sticks Sonst Lebens Blattaus Sozio

Rote Liste RLP 1988
Roteliste Ggrac GgradN Bemerkung
 1

giftig Heilpflanze Küche Naturschutz

Arealdiagnose
austrAM + sm/mo-b subozEUR + AM

Pflanzengesellschaft
O Nard.

Bemerkung
bodensaure Magerrasen, lichte Wälder, selten, fehlt in den Alpen

Andrea´s Botanik - Datenbank

Abteilung
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung
Pterophytina - Farne

Klasse
Eusporangiate (Ophioglossopsida) -

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung
Ophioglossales - Natternzungenartige

Familie latein
Ophioglossaceae

Familie dt
Natternzungengewächse

Lateinischer Artnamen

Botrychium multifidum

Synonyme

Botrychium rutaceum, Botrychium rutaefolium

Deutscher Artnamen

Vielteiliger Rautenfarn

Länge bzw. Höhe in m
0,10-0,25

Sammelart mehrere Unterarten einjährig Sommer einjährig überwinter zweijährig hapaxanth ausdauernd Holzgewächs

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig Heilpflanze Küche Naturschutz

Arealdiagnose

sm/mo-b subozCIRCPOL

Pflanzengesellschaft

O Nard.

Bemerkung

frische, bodensaure Magerrasen, lichte Wälder, selten, z. T. verschollen

Andrea's Botanik - Datenbank

Abteilung
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung
Pterophytina - Farne

Klasse
Eusporangiatæ (Ophioglossopsida) -

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung
Ophioglossales - Natternzungenartige

Familie latin
Ophioglossaceae

Familie dt
Natternzungengewächse

Lateinischer Artname

Botrychium simplex

Synonyme

Deutscher Artname

Einfacher Rautenfarn

Länge bzw. Höhe in m
0,08-0,15

Sammelart mehrere Unterarten einjährig Sommer einjährig überwinternd zweijährig hapaxanth ausdauernd Holzgewächs

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig Heilpflanze Küche Naturschutz

Arealdiagnose

temp-b subozEZR + AM

Pflanzengesellschaft

K Call.-Ulic., O Nard.

Bemerkung

frische, bodensaure Magerrasen und Heiden, früher selten im Nordosten und Baden-Württemberg

Andrea´s Botanik - Datenbank

Abteilung
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung
Pterophytina - Farne

Klasse
Eusporangiatæ (Ophioglossopsida) -

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung
Ophioglossales - Natternzungenartige

Familie latein
Ophioglossaceae

Familie dt
Natternzungengewächse

Lateinischer Artnamen

Botrychium virginianum

Synonyme

Deutscher Artnamen

Virginischer Rautenfarn

Länge bzw. Höhe in m
0,10-0,80

Sammelart mehrere Unterarten einjährig Sommer einjährig überwinter zweijährig hapaxanth ausdauernd Holzgewächs

Blütezeit
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg
Licht Temp Kont Feucht Reakt Sticks Sonst Lebens Blattaus Sozio

Rote Liste RLP 1988
Roteliste Ggrac GgradN Bemerkung
 Nein

giftig Heilpflanze Küche Naturschutz

Arealdiagnose
strop/moAM + m-b suboz CIRCPOL
Pflanzengesellschaft

Bemerkung
mäßig saure Bergheiden und Magerrasen, Bayern