Andrea´s Botanik - Datenbank

Abteilung	Unterabteilung	Klasse
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen	Pterophytina - Farne	Leptosporangiatae (Polypodiopsida) -
Unterklasse	**Ordnungsgruppe**	**Ordnung**
		Polypodiales - Tüpfelfarnartige
Familie latein	**Familie dt**	
Aspleniaceae	Streifenfarngewächse	

Lateinischer Artname

Ceterach officinarium

Synonyme

Asplenium ceterach

Deutscher Artname

Milzfarn

Länge bzw. Höhe in m
0,05-0,20

Sammelart	mehrere Unterarten	einjährig	Sommer	einjährig überwinter	zweijährig	hapaxanth	ausdauernd	Holzgewächs
							Ja	

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
					Ja	Ja	Ja				

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
8	9	3	2	8	2	-	H	I	4.2

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrad	GgradN	Bemerkung
Nein			

giftig	Heilpflanze	Küche	Naturschutz

Arealdiagnose

m-temp (oz)EUR- WAS

Pflanzengesellschaft

K Aspl. rup.

Bemerkung

lichtreiche, warme Felsen und Mauern, zerstreut im Südwesten, Rheinland-Pfalz und Hessen, sonst selten