

Andrea's Botanik - Datenbank

Abteilung
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung
Pterophytina - Farne

Klasse
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

Familie latein
Aspidiaceæ

Familie dt
Schildfarngewächse

Lateinischer Artname

Gymnocarpium dryopteris

Synonyme

Dryopteris linnaeana, Lastrea dryopteris

Deutscher Artname

Eichenfarn

Länge bzw. Höhe in m
0,10-0,40

Sammelart	mehrere Unterarten	einjährig Sommer	einjährig überwinter	zweijährig	hapaxanth	ausdauernd	Holzgewächs
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blütezeit											
Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg									
Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
3	3	5	6	4	5	-	G	S	8.43

Rote Liste RLP 1988			
Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig	Heilpflanze	Küche	Naturschutz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Arealdiagnose
m/mo-arct (suboz)CIRCPOL

Pflanzengesellschaft
K Carp.-Fag., K Vacc.-Pic., V Aden.

Bemerkung
farnreiche Hangwälder, Hochstaudenfluren, kalkmeidend, verbreitet

Andrea´s Botanik - Datenbank

Abteilung
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung
Pterophytina - Farne

Klasse
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

Familie latein
Aspidiaceæ

Familie dt
Schildfarngewächse

Lateinischer Artname

Gymnocarpium robertianum

Synonyme

Dryopteris robertiana, Lastrea obtusifolia, Lastrea calcaria

Deutscher Artname

Ruprechtsfarn

Länge bzw. Höhe in m
0,10-0,40

Sammelart	mehrere Unterarten	einjährig Sommer	einjährig überwinter	zweijährig	hapaxanth	ausdauernd	Holzgewächs
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ja	<input type="text"/>

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ja	Ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Blühfarbe

<input type="text"/>

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
5	4	5	5	8	x	-	G	S	4.41

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

giftig	Heilpflanze	Küche	Naturschutz
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Arealdiagnose
m/mo-b (subk)CIRCPOL

Pflanzengesellschaft
O Thlasp. rot., V Pot. caul.

Bemerkung
schattige, kalkreiche Steinschuttfuren, kalkhaltige Felsen und Mauern, in den Alpen verbreitet, im Süden zerstreut, im Norden selten