

# Andrea's Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Thelypteridaceæ

**Familie dt**  
Sumpffarngewächse

Lateinischer Artname

## Lastrea limbosperma

Synonyme

Dryopteris montana, Dryopteris oreopteris, Thelypteris limbosperma, Oreopteris limbosperma

Deutscher Artname

### Bergfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,50-1,00

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
4	4	2	6	3	5	-	H	S	x

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

sm/mo-b ozEUR + OAS-WAM

Pflanzengesellschaft

K Carp.-Fag., O Vacc.-Pic., V Aln., K Bet.-Aden.

Bemerkung

Schleier früh abfallend, Blattunterseite mit goldgelben Drüsen  
Bergwälder, Bruchwälder, an Waldgräben und -Hängen, Hochstaudenfluren, kalkmeidend, im Süden verbreitet, im Norden selten