

Andrea´s Botanik - Datenbank

Abteilung
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung
Lycophytina - Bärlappe

Klasse
Lycopsida - Bärlappähnliche

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung
Lycopodiales - Bärlappartige

Familie latein
Lycopodiaceae

Familie dt
Bärlappgewächse

Lateinischer Artnamen

Lycopodiella inundata

Synonyme

Lycopodium inundatum, Lepidotis inundata

Deutscher Artnamen

Gemeiner Moorbärlapp

Länge bzw. Höhe in m
0,02-0,10

Sammelart mehrere Unterarten einjährig Sommer einjährig überwinternd zweijährig hapaxanth ausdauernd Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
8	4	2	9	3	2	-	C	W	1.711

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Ja	2	N	<input type="checkbox"/>

giftig Heilpflanze Küche Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----

Arealdiagnose

sm-b oz CIRCPOL

Pflanzengesellschaft

V Rhynch. alb.

Bemerkung

nackte Torfböden von Hoch- und Zwischenmooren, feuchte, schlammig-humose Dünenenken, zerstreut vorkommend