

Andrea´s Botanik - Datenbank

Abteilung
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung
Pterophytina - Farne

Klasse
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung
Marsileales - Kleefarnartige

Familie latein
Marsileaceæ

Familie dt
Kleefarngewächse

Lateinischer Artnamen

Marsilea quadrifolia

Synonyme

Deutscher Artnamen

Vierblättriger Kleefarn

Länge bzw. Höhe in m
0,05-0,15

Sammelart mehrere Unterarten einjährig Sommer einjährig überwinternd zweijährig hapaxanth ausdauernd Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
7	8	5	10	x	7	-	A	S	3.111

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Ja	0		*

giftig Heilpflanze Küche Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

sm/stemp (oz)EUR + WAS

Pflanzengesellschaft

V Nanocyp.

Bemerkung

nährstoffreiche, nasse, sandig-tonige Schlammböden in Kiesgruben und Tümpeln, früher in Baden-Württemberg (Rheintal selten), sonst nur (Neophyt seit 1980?) Nordrhein-Westfalen: Wahner Heide