

Andrea's Botanik - Datenbank

Abteilung  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung  
Lycophytina - Bärlappe

Klasse  
Lycopsida - Bärlappähnliche

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung  
Selaginellales - Moosfarnartige

Familie latin  
Selaginellaceae

Familie dt  
Moosfarngewächse

Lateinischer Artnamen

# Selaginella helvetica

Synonyme

Lycopodioides helvetica

Deutscher Artnamen

## Schweizer Moosfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,02-0,08

Sammelart	mehrere Unterarten	einjährig Sommer	einjährig überwinter	zweijährig	hapaxanth	ausdauernd	Holzgewächs
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ja	Nein

Blütezeit											
Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ja	Ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg									
Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
5	6	4	5	8	2	-	C	I	5.321.4

Rote Liste RLP 1988			
Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

giftig	Heilpflanze	Küche	Naturschutz
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Arealdiagnose

sm/mo-temo/mo suboz-EZR + OAS

Pflanzengesellschaft

V Mesobrom.

Bemerkung

Kalkmagerrasen, schattige Felsen und Mauern, in den Alpen verbreitet, selten in Bayern (Hochebene, Fränkische Alb, Baden Würtemberg: Bodensee, Württemberger Oberland, Fichtelgebirge, Erzgebirge (Heinzebank bei Lengefeld), früher Thüringer Wald (Inselberg, Schmielefeld))

Andrea's Botanik - Datenbank

Abteilung  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung  
Lycophytina - Bärlappe

Klasse  
Lycopsida - Bärlappähnliche

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung  
Selaginellales - Moosfarntige

Familie latein  
Selaginellaceae

Familie dt  
Moosfarngewächse

Lateinischer Artnamen

# Selaginella selaginoides

Synonyme

Selaginella spinulosa

Deutscher Artnamen

## Dorniger Moosfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,03-0,12

Sammelart	mehrere Unterarten	einjährig Sommer	einjährig überwinter	zweijährig	hapaxanth	ausdauernd	Holzgewächs
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ja	Nein

Blütezeit											
Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ja	Ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg									
Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
7	1	3	7	7	3	-	C	I	1.72

Rote Liste RLP 1988			
Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

giftig	Heilpflanze	Küche	Naturschutz
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Arealdiagnose

sm/alp-arct (oz)CIRCPOL

Pflanzengesellschaft

O Tofield., V Nard.

Bemerkung

subalpine und alpine Magerrasen, Quellmoore und kalkreiche, rieselnasse Stellen, in den Alpen verstreut, in Bayern selten in der Hochebene, Schwarzwald: Feldberg, früher im Harz (Brocken)